

2015 年香港艾滋病治疗和护理流程

薛耀威医生 舒宝儿高级医生 陈志伟顾问医生
香港特别行政区卫生署卫生防护中心特别预防计划

目的

这是香港首个官方艾滋病治疗和护理流程，用以显示艾滋病感染者从诊断到病毒抑制的不同阶层的比例。我们分别计算出整体和男男社群的治疗和护理流程。

方法

我们运用以下数据源去计算治疗和护理流程：「艾滋病流行模型」、「艾滋病病毒感染个案呈报系统」的数据及「香港死亡人口列表」去计算存活的感染者人数；利用香港三家政府成年艾滋病诊所的「追踪监控数据」去计算接受治疗及病毒抑制的比例。所有数据都以 2015 年 12 月 31 日当天计算，并已排除确定死亡及确定离开香港的感染者；三年没就诊的感染者和二年没就诊的病发者，也当作已经死亡或离港。病毒载量从二家政府化验所取得，抑制标准分别为每毫升 20 单位和 40 单位。


结果

于 2015 年 12 月 31 日，整体治疗和护理流程(图一)推算香港一共有 6347 名艾滋病病毒感染者(第一阶层)，其中 75.6% 已被诊断 (第二阶层)；69.9% 曾经在艾滋病诊所接受护理(第三阶层)；67.1% 过去一年仍在艾滋病诊所接受护理(第四阶层)；63.6% 正在服用高效抗逆转录病毒治疗(第五阶层) 及 55.5% 已达到病毒抑制 (第六阶层)。至于男男社群的治疗和护理流程(图二)，第一阶层推算有 3109 名艾滋病感染者；第二阶层 80.5%，第三阶层 78.2%，第四阶层 75.2%，第五阶层 70.6% 及 第六阶层 59.7%。

结论

男男社群的接受药物治疗和达到病毒抑制比例高于整体情况。

图一 整体艾滋病治疗和护理流程



图二 男男社群的艾滋病治疗和护理流程

