萌 ……枝幹的嫩葉萌芽處

萌 是由联合国艾滋病规划署合作中心（专业支援）— 红丝带中心，为推动全球爱滋病活动而制作的中英文刊物。

新闻稿

聯合国艾滋病規划署（UNAIDS）及聯合国人口基金（UNFPA）發布全球艾滋病預防聯盟（Global HIV Prevention Coalition）第四次年度进展报告

日内瓦，2020年11月23日－全球艾滋病预防联盟的最新进展报告显示，虽然部分国家新感染爱滋病病毒的成年人人数明显下降，但病毒预防工作的整体进度仍参差不齐，要实现于2016年联合国终结艾滋病高级别会议（United Nations High-Level Meeting on Ending AIDS）上承诺于2020年实现的目标，进度依然太慢。

「如果年复年地有人继续感染爱滋病病毒，我们就无法终结爱滋病。」联合国艾滋病规划署（UNAIDS）执行干事温妮・拜安伊玛（Winnie Byanyima）表示。「今年是点算以往十年对2030年终结爱滋病进展的一个里程碑。令人遗憾的是，世界各地未能履行大幅减少新增爱滋病病毒感染的承诺。」

在2016年，联合国会员国承诺在2020年前将全球新增爱滋病病毒感染的成年人数量降至少于50万，比2010年减少75%。直至2019年年底，下降幅度仅为23%，而去年有170万人感染爱滋病病毒。

全球艾滋病预防联盟于2017年成立，旨在为28个重点国家（即全世界新增爱滋病病毒感染负担最重的28个国家）的爱滋病病毒预防计划带来新的动力和清晰度。28个联盟成员国已确定及积极推动优先方案和预防措施，重燃对预防爱滋病病毒的政治承诺，并指导和支持计划的施行。

联盟成员国在减低新增爱滋病病毒感染方面的进展各有不同。例如斯威士兰由2010年至2019年

期间，新增爱滋病病毒感染率下降了64%；而巴基斯坦的感染率则增加了74%。但在其中26个联盟成员国中，新增爱滋病病毒感染率则有所下降。

报告亦指出，成员国在执行*《2020年全球艾滋病预防路线图》（Global HIV Prevention 2020 Road Map）*其中十项策略性行动中取得了重大进展，但某些成员国在改变潜在的因素上遇上困难，阻碍有效的爱滋病病毒预防方案。其困难包括资金短缺、对于重点及弱势社群的方案，没有采取足够行动应对相关的法律、政策和结构性障碍，以及缓慢采纳社会契约的指导。

联合国人口基金代理执行主任娜塔莉亚·加奈姆（Natalia Kanem）说：「为了大幅减少新增的爱滋病病毒感染，我们必须弥合分歧，消除阻碍少女、青年妇女和重点社群获得高质量、受尊重的性与生殖健康服务的障碍。现在是一次过消除所有与她们有关的污名化、歧视和边缘化行为的最佳时候。」

2019冠状病毒病疫情是今年维持爱滋病病毒预防工作进展的额外挑战，特别令人关注的是爱滋病病毒预防相关的服务中断，如男性自愿包皮环切术、预防性产品包括安全注射用品供应中断、社区封锁对教育和社区支援服务的影响，以及经济衰退与增加爱滋病病毒高风险行为和受影响性之间的相互作用。因此，今年的报告开始记录各国为减轻2019冠状病毒病疫情的潜在影响而采取的调整措施。

全球艾滋病预防联盟重点国家的卫生部长在一次虚拟会议上发表进展报告，会上各成员点算了迄今取得的进展，目的是为今后五年指明方向，并于2030年终结爱滋病。

拜安伊玛女士补充：「爱滋病病毒预防将会是今后五年新的全球爱滋病策略的核心。我们将与联合国人口基金及联合国艾滋病规划署的其他机构携手，支持全球艾滋病预防联盟实现零新增爱滋病病毒感染的最终目标。」

联合国艾滋病规划署 日内瓦 | Sophie Barton-Knott | 电话 +41 79 514 68 96 | bartonknotts@unaids.org

联合国艾滋病规划署 传媒 | 电话 +41 22 791 4237 | communications@unaids.org

聯合國艾滋病規劃署

联合国艾滋病规划署(UNAIDS)带领和鼓励世界各地人民实现零爱滋病新增感染、零歧视、零爱滋病相关死亡的共同愿景。联合国艾滋病规划署汇集11个联合国组织的力量，包括联合国难民署(UNHCR)、联合国儿童基金会(UNICEF)、世界粮食计划署(WFP)、联合国开发计划署(UNDP)、联合国人口基金 (UNFPA)、联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)、联合国妇女署(UN Women)、国际劳工组织(ILO)、联合国教科文组织(UNESCO)、世界卫生组织(WHO)和世界银行(World Bank)，与全球各国合伙人紧密合作，全力争取在2030年前遏止爱滋病疫情，达成其中一个重要的可持续发展目标。详情请浏览unaids.org 或透过 Facebook、Twitter、Instagram 及 YouTube 联络我们。

香港男男性接触者（MSM）使用网上订购爱滋病自我检测（HIVST）及上传结果的可行性研究结果

卫生署特别预防计划

薛耀威医生

背景

爱滋病自我检测是指一个人透过自行采集样本、进行检测及解读检测结果的过程，以了解其感染爱滋病病毒的状况。它能对爱滋病病毒一型(HIV-1）抗体及爱滋病病毒二型（HIV-2）抗体的存在作初步筛查，并不能作确诊之用。任何阳性的自我检测结果必须抽取静脉血液样本，并送到化验所进行确诊测试。对于未能接受现有自愿辅导和检测服务（VCT）的人士，爱滋病自我检测可以让他们方便及自在地进行测试以了解其感染状况。



方法

为了探讨爱滋病自我检测的可行性和接受性，卫生署于2019年9月至2020年6月设立一个专用网站，招募参加者于网上订购自我检测套件。是项研究计划采用的口腔液自我检测套件（Oraquick®）分别于2012年及2017年7月获得美国食品药品监督管理局的核准及世界卫生组织的认可。任何成年人士（18岁或以上）只要曾经进行口交、阴道性交或肛交，且持有有效的本地手机号码均符合本研究计划的参加条件。虽然这项研究的主要对象是男男性接触者，由于无法在网站上核实参加者的性取向，只能透过参加者在问卷中自行填写其性取向以确定其是否男男性接触者。

参加者可从研究计划的网站订购自我检测套件，除了填写联络电话、问卷和收货地点外，无须输入其他个人资料。参加者需透过电子付款方式支付港币115元的检测套件费用，在订购后14天内上载结果和照片，卫生署人员会核实其结果并以短讯通知，套件款项会被退还予参加者。如测试结果呈阳性，而参加者亦同意向卫生署人员提供联系方法，卫生署人员会为其安排抽血作确认测试。若结果是无效，参加者可重新订购一套免运费的检测套件。

结果

（一）参加者的特征

研究期间一共接受了1,426人次订购。剔除订购多于一次的参加者后，实际招募的人数为1,260人，其中86.8%为男男性接触者。而男男性接触参加者中，大部份人士（84.3%）年龄介乎20-39 岁，97.6%为华裔。

（二）爱滋病检测行为

在男男性接触参加者中，有30.8%是「首次测试者」。曾经进行过测试的百分率（69.2%）低于先前的社区调查结果（PRiSM 2017为79%），而本研究的参加者的年龄则较为年轻。在过去12个月内曾接受测试的百分率（42.1%）也较PRiSM 2017 中的 52.6%为低。

（三）自我检测结果和经验

超过93%参加者上载检测结果（n = 1,328）。在1,325个经由卫生署人员核实的结果中，共有15个阳性（1.1%）和17个无效（1.3%）的检测结果。15个阳性结果中，有6个参加者提供了联络方法并同意被转介至卫生署爱滋病辅导及测试服务进行确认测试。参加者与卫生署人员对测试结果诠释的吻合度高达98.5%。整体而言，有96.8%上载了结果的参加者表示有兴趣再次在网站订购，其中85.9%的人士表示，由于加多了爱滋病自我检测这个选项，他们会增加爱滋病检测的频率。

基于本研究提供了清晰的文字和视听使用说明，98.5%的参加者是在没有任何技术支援下自行解读结果，而97.9%的参加者在上载检测结果过程中不需要任何情绪支援。在研究期间亦没有收到社会危害和事故的报告。

在所有参加者中，有142人（10.0%）订购了多于一次（不包括9名因无效结果而重新订购检测套件的人士）。在所有组别中，男男性接触者的再次订购率最高（11.6%）。

分析

从参加者的满意程度可见本地男男性接触者社群非常接受以采集口腔液进行爱滋病自我检测。结果上载百分率甚高（> 90%），参加者与卫生署人员对结果诠释的吻合度也很高。在进行测试时，甚少参与者需要技术支援。非政府组织和诊所在2019冠状病毒病疫情期间停止了测试服务，而自我检测刚好成为一种替代测试的选择。大部分男男性接触参加者（86.5%）表示会增加进行爱滋病检测的频率。

整体而言，从参加者的意见和上载结果的百分率可见，以采集口腔液进行的爱滋病自我检测得到了广泛认可，而提供清晰的图示和文字使用说明能有助大部份参加者正确解读结果。

2020全球同抗爱滋病运动：为基层医疗医护专业人员举办的爱滋病及性病会议(HIV-STI Conference for Primary Health Care Professionals)

卫生署特别预防计划

何志轩（高级医生）

基层医疗作为医疗体制的第一层，往往是提供医疗服务的最初接触点。由于基层医护人员与病人接触频繁，他们在治疗爱滋病病毒（HIV）和性病（STIs）方面担当着重要的角色。基层医疗专业人员在早期诊断及提供必要的治疗和适切的转介方面具有独特的身份，他们亦能在各方面帮助预防和控制爱滋病病毒和性病传播，如提供健康教育、性风险评估、爱滋病病毒快速检测、性病筛查和治疗等。要成功管理爱滋病病毒感染者和性病患者，与他们建立有效的沟通、提供持续的护理，并保持紧密的医患关系至关重要。

于2020年11月28日，隶属卫生署特别预防计划的红丝带中心联同香港家庭医学学院为基层医疗医护人员举办的爱滋病及性病会议，是2020年全球同抗爱滋病运动的其中一环，旨在向参加者



提供有关治疗及预防爱滋病病毒和性病的最新资讯，并提高他们对性小众的认识和敏感度。此网上培训活动共录得约580名医护人员参加，其中大部分来自医管局和卫生署。

会议期间，来自公营、私营机构及学术界的专家和医疗专业人员阐述爱滋病病毒和性病的诊断和治疗，内容涵盖爱滋病病毒暴露前预防(PrEP)及暴露后预防(PEP)、爱滋病病毒自我检测、性小众的心理健康以及接触性小众的技巧。会后评估得到参加者的正面回响，参加者均认为会议内容丰富并实用。在2019冠状病毒病疫情及保持社交距离等防疫措施下，卫生署红丝带中心将继续致力为从事预防爱滋病病毒及性病领域工作的专业人员和公众举办网上工作坊和研讨会，让他们可在网上获得最新有关爱滋病病毒及性病资讯。