

- 通常の処置では、赤ちゃんへの感染予防を促進するために、できるだけ早くARTの経口と点滴による投与を行います。
- HIV感染のリスクを最小限にできるよう、医師により出産方法が決定されます。
- 出産後には母乳を与えないことを強くお勧めします。
- 新生児は経口によるART投与の継続と、生後数週間後には予防と合併症の早期発見のために小児科医による追跡治療が必要です。
- 感染が確認された場合は、赤ちゃんの健康状態を促進するために、適切な治療と追加治療がなされます。

赤ちゃんを守るためにテストをお受けください。

HIV簡易テストとエイズに関してのより詳細なご質問は、医師あるいは看護婦にご相談ください。また、エイズ・ホットライン（2780-2211）のカウンセラーへも、どうぞお問い合わせください

詳細のお問い合わせ先：

エイズ・ホットライン: 2780 2211
ウェブサイト: www.aids.gov.hk

レッドリボン・センター 国連共同エイズプログラム
技術サポート・コラボレーション・センター
住所：2/F., Wang Tau Hom Jockey Club Clinic,
200 Junction Road East,
Kowloon, Hong Kong
電話：(852) 3143 7200
ファックス：(852) 2338 0534
メール：rrc@dh.gov.hk



簡易HIV テスト 妊産婦の方へ



あなたの赤ちゃんを守ろう

日文 Japanese

妊産婦のための簡易HIVテストの目的

妊婦が出産前に自分のHIV状態を知っておくのは重要なことです。早期発見によって、赤ちゃんへの感染の危険を少なくするための措置をとることができます。香港では、普通すべての妊婦が妊産婦検診医でHIVテストを受けています。しかしながら、通常のHIVテストは検査過程に一週間以上もかかります。

したがって、自分のHIV状態について知らない出産直前の妊婦は、赤ちゃんを守るための適切な措置をとるために、数分で検査ができる簡易HIVテストを今すぐ受けるべきです。

簡易HIV テストを受ける前に、エイズの影響と予測される結果について理解しておく必要があります。

エイズ - 後天性免疫不全症候群

- エイズはヒト免疫不全ウイルス（HIV）によって起こります。体内に入った後、ウイルスが複製し、免疫機能を破壊します。徐々に身体の抵抗力を弱め、免疫機能が日和見感染症または異常な腫瘍などを抑えられなくなり、最終的には死に至ります。
- 感染経路には性交渉、血液接触、または感染している母体からの妊娠中や出産時あるいは授乳時の赤ちゃんへの感染が含まれます。母子感染の感染率は15%—40%です。
- 通常の社会的接触、蚊などの虫さされではHIVは感染しません。

簡易テストとは？ どのように行うのですか？


- このテストは血液検体中のHIV抗体を検出します。
- 血液検体は指先または静脈から採取します。指先からごく少量の血液飛沫を採取し、20分後には検査結果が出ます
- 簡易HIVテストの結果は、陰性(-ve)または陽性(+ve)として表されます。



指先穿刺による血液
採取



ループを(血液とともに)
検査キットへ入れる



検査検査結

簡易HIV 陰性(-ve)結果

- 簡易HIVテスト結果が陰性である場合は、妊婦がHIVに感染していないことを示しています。しかし「潜伏期間」について知っておく必要があります。感染してもまだHIV抗体の生成量が検出されるほど多くないこともあり、これにより誤って陰性結果が出る可能性があります。これは、赤ちゃんへのウィルス感染の可能性を意味しています。
- HIV陰性結果が出た妊婦は、自分自身と胎児を守るために引き続きHIV感染への予防措置をとらなくてはなりません。これには、コンドームを使用するなどのより安全な性行為や、薬物使用者の注射針の使い回しをやることなどが含まれます。

簡易HIV 陽性(+ve)結果

- 簡易HIVテスト結果が陽性である場合は、その妊婦がHIVに感染している恐れがあり、赤ちゃんがHIVウィルスにさらされているかもしれないことを示しています。
- しかし、誤った陽性結果が出ることもあるので、最初の検査結果が陽性だった場合、血液検体は再確認のために研究所へ送られます。

簡易HIVテストの結果は極秘扱いです

早期発見はどうして赤ちゃんのためになるのですか？

- 研究によると、早期診断と早急な抗レトロウイルス療法（ART）は、出産時から開始し新生児への治療を続けたとしても、HIVの母子感染を50%まで抑えることがわかっています。