

- 에이즈 바이러스가 태아에게 감염되지 않도록 구강 및 혈액을 통해 항레트로바이러스 치료를 합니다.
- 의사가 에이즈 바이러스 감염을 최소화할 수 있는 분만 방법을 결정하게 됩니다.
- 영아 출생 후 모유 수유는 하지 않도록 합니다.
- 소아과 의사가 출생 후 몇 주 간 구강 검사를 통해 영아를 진찰하여 예방 및 합병증 조기 진단을 하게 됩니다.
- 감염이 확인되면 영아의 건강을 증진시킬 수 있도록 적절한 치료를 시행하게 됩니다.

상세 정보 참고

AIDS 핫라인 : 2780 2211
사이트 : www.aids.gov.hk

아기를 보호할 수 있도록 꼭 검사를 받으세요.

신속한 HIV 테스트와 에이즈에 관한 기타 문의는 의사나 간호사를 통해 하실 수 있습니다.

또한 에이즈 핫라인 2780 2211을 통해 카운슬러와 상담하실 수 있습니다.

레드리본 센터- UNAIDS 기술 협력 센터
주소: 2/F., Wang Tau Hom Jockey Club Clinic,
200 Junction Road East,
Kowloon, Hong Kong
전화: (852) 3143 7200
팩스: (852) 2338 0534
이메일: rrc@dh.gov.hk



신속한 HIV 테스트로 임산부는



아기를 보호합니다

韓文 Korean

임산부를 위한 신속한 HIV 테스트의 목표

임신한 여성은 분만 전에 에이즈 바이러스 감염 여부를 확인해야 합니다. 조기 진단을 통해 바이러스가 아기에게 감염될 위험을 줄일 수 있습니다. 홍콩에서 임신한 모든 여성들은 임산부 진료소에서 HIV 테스트를 정기적으로 받습니다. 하지만 일반적인 HIV 테스트는 한 주 이상이 걸립니다. 따라서 분만 예정일이 가까운데 아직 에이즈 바이러스 여부를 모르는 여성들은 '반드시' 단 몇 분만에 되는 신속한 HIV 테스트를 통해 아기를 보호할 수 있는 적절한 조치를 취해야 합니다.

신속한 HIV 테스트를 받기 전에 에이즈와 그 의미 그리고 결과에 대해 알고 있어야 합니다.

AIDS - 후천성 면역 결핍증

- 에이즈는 인체 면역 결핍 바이러스, 즉 HIV로 인해 발생합니다. 이 바이러스는 일단 신체 내에 들어가서 면역 체계를 복제하고 파괴합니다. 이로써 신체 저항력이 점차 떨어져 면역 체계가 이차 감염이나 비정상적인 종양을 막지 못하면 결국 사망에 이를 수 있습니다.
- 감염은 성관계나 혈액 접촉을 통해 일어나거나 감염 여성이 임신 중이나 분만, 수유로 태아에게 전염할 수 있습니다. 임산부가 아기에게 전염시키는 경우는 15퍼센트에서 40퍼센트에 이릅니다.
- 일상적인 사회적 접촉이나 모기 및 곤충을 통해서에는 에이즈 바이러스에 감염되지 않습니다.

신속한 테스트와 그 방법


- HIV 항체를 혈중에서 검출합니다.
- 손가락이나 정맥에서 혈액을 채취합니다. 손가락에서 나온 소량의 혈액으로 20분 후에 검사 결과를 알 수 있습니다.
- 신속 HIV 테스트 결과는 음성(-ve)이거나 양성(+ve)으로 나옵니다..



손가락에서 혈액 채취



테스트 기구 안에 혈액이 든 루프 넣기



검사 결과

신속한 HIV 음성 (-ve) 결과

- HIV 검사 결과가 음성일 경우에는 임신 여성이 에이즈 바이러스에 감염되어 있지 않다는 것입니다. 하지만 '잠복 기간'도 고려해야 합니다. 감염되었어도 에이즈 바이러스 항체 생성이 충분하지 않아 검출되지 않을 수도 있습니다. 이 경우 잘못된 음성 결과로서 태아에게 바이러스가 전염될 가능성이 있습니다.
- 에이즈 바이러스 음성 결과를 받은 임신 여성은 본인과 태아가 에이즈 바이러스에 전염되지 않도록 예방해야 합니다. 콘돔을 사용하여 보다 안전한 성관계를 가지거나 마약주사를 사용하지 않음으로써 에이즈를 예방할 수 있습니다.

신속한 HIV 양성 (+ve) 결과

- HIV 검사 결과가 양성일 경우에는 임신 여성이 에이즈 바이러스에 감염되었을 가능성이 있으며 태아도 감염될 수 있음을 의미합니다.
- 그러나 잘못된 양성 결과가 나올 수도 있으므로 초기 검사에서 양성 결과가 나올 경우 혈액을 연구소에 보내 확인하게 됩니다.

HIV 검사 결과는 철저히 비밀이

초기 진단 - 아기에게 어떻게 도움이 될까요?

- 연구에 따르면 초기 진단과 신속한 항레트로바이러스 치료(ART)로 태아에게 에이즈 바이러스가 감염될 가능성을 50퍼센트로 줄일 수 있으며 분만 중에 시작하여 이후 신생아에게