

- Biện pháp thường được áp dụng là thực hiện liệu pháp ART bằng uống thuốc và tiêm tĩnh mạch ngay khi có thể để ngăn ngừa sự lây truyền HIV cho em bé.
- Bác sĩ sẽ chỉ định cách sinh bé để hạn chế tối đa nguy cơ lây truyền HIV.
- Nghiêm khắc ngăn chặn việc cho bú sữa mẹ sau khi sinh.
- Em bé phải được tiếp tục cho uống thuốc theo liệu pháp ART và phải được bác sĩ nhi khoa theo dõi trong vài tuần sau khi sinh để phòng ngừa và phát hiện sớm các biến chứng.
- Một khi được xác nhận là đã bị nhiễm, em bé sẽ cần được điều trị thích hợp và theo dõi chăm sóc để cải thiện tình hình sức khỏe bé.

Để bảo vệ con bạn, xin hãy thực hiện xét nghiệm.

Bạn nên tìm hiểu thêm về phương pháp xét nghiệm nhanh và AIDS, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y sĩ của bạn.

Hoan nghênh bạn liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi qua số điện thoại nóng 2780 2211.

Để biết thêm thông tin:

Số điện thoại nóng : 2780 2211

Trang thông tin điện tử: www.aids.gov.hk

Red Ribbon Centre – Trung tâm hợp tác hỗ trợ kỹ thuật phòng chống AIDS

Địa chỉ: 2/F., Wang Tau Hom Jockey Club Clinic,
200 Junction Road East,
Kowloon, Hong Kong

Điện thoại: (852) 3143 7200

Fax: (852) 2338 0534

Thư điện tử: rrc@dh.gov.hk



Xét nghiệm HIV nhanh cho

Phụ nữ mang thai



Hãy bảo vệ con bạn

越南文 Vietnamese

Mục tiêu của việc xét nghiệm HIV nhanh cho phụ nữ có thai.

Việc một phụ nữ mang thai biết rõ tình trạng nhiễm HIV của mình trước khi sinh là rất quan trọng. Phát hiện điều này sớm sẽ giúp cô ấy thực hiện những bước cần thiết để giảm thiểu nguy cơ truyền bệnh cho em bé. Ở Hong Kong, tất cả phụ nữ mang thai đều được kiểm tra HIV định kỳ tại các phòng khám thai sản. Tuy nhiên, một xét nghiệm HIV theo kiểu truyền thống sẽ phải mất đến 1 tuần để biết kết quả. Vì thế, với bất kỳ phụ nữ nào muốn sinh con và bảo vệ bản thân mình có bị nhiễm HIV hay không, một xét nghiệm HIV nhanh trong vài phút là một điều **NÊN** được làm ngay lập tức để có thể thực hiện những động tác cần thiết nhằm bảo vệ em bé.

Mọi người cần phải hiểu về AIDS, cách lây truyền và tác động của việc có một kết quả xét nghiệm dương tính trước khi thực hiện một xét nghiệm HIV nhanh

AIDS – Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải

- AIDS gây ra bởi Human Immunodeficiency Virus (virus gây suy giảm miễn dịch ở người), viết tắt là HIV. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus nhân lên và phá hủy hệ thống miễn dịch. Nó làm suy yếu sức đề kháng của cơ thể dần dần, khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm các bệnh cơ hội hoặc bị các khối u bất thường, và cuối cùng là cái chết.
- Các đường lây nhiễm thông thường là sinh hoạt tình dục, truyền máu hoặc từ mẹ sang con trong suốt thời gian mang thai, sinh ra hoặc cho con bú. Tỷ lệ truyền từ mẹ sang con là khoảng 15% đến 40%.
- HIV không lây truyền qua những giao tiếp xã giao thông thường, việc bị muỗi và các côn trùng chích , cắn.

Xét nghiệm nhanh là gì và tiến hành nó như thế nào?


- Xét nghiệm này nhằm phát hiện kháng thể kháng HIV trong mẫu máu.
- Mẫu máu được thu nhận bằng cách trích máu từ đầu ngón tay hoặc rút máu từ tĩnh mạch. Một giọt máu nhỏ được lấy từ ngón tay của bạn và bạn sẽ có kết quả sau 20 phút.
- Kết quả của xét nghiệm HIV nhanh có thể là âm tính/không nhiễm (-ve) hoặc dương tính/đã nhiễm (+ve).



Trích máu từ đầu ngón tay



Đưa que thử (có mẫu máu) vào bộ xét nghiệm



Kết quả

Kết quả xét nghiệm HIV âm tính (-ve)

- Một kết quả âm tính với xét nghiệm nhanh này có nghĩa là thai phụ không bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, mọi người cũng cần đề phòng “giai đoạn cửa sổ”. Khi một người mới bị nhiễm, lượng kháng thể kháng HIV sản xuất ra có thể không đủ cao để được phát hiện, dẫn đến kết quả xét nghiệm là “âm tính giả”, tức là vẫn có khả năng tiềm tàng một sự lây truyền virus từ mẹ sang em bé.
- Một thai phụ có kết quả xét nghiệm máu âm tính với HIV nên tiếp tục có những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình và thai nhi khỏi sự lây nhiễm virus HIV. Các biện pháp này bao gồm tình dục an toàn như sử dụng bao cao su và tránh dùng chung kim tiêm.

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính (+ve)

- Một kết quả dương tính với xét nghiệm HIV nhanh này có nghĩa là thai phụ rất có khả năng bị nhiễm HIV và rằng em bé có thể đã bị truyền HIV.
- Tuy nhiên, một kết quả “dương tính giả” vẫn có thể xảy ra, vì thế, mẫu máu sẽ cần được gửi đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm kỹ hơn nếu xét nghiệm ban đầu này cho kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm HIV nhanh là hoàn toàn đáng tin cậy

Phát hiện sớm có lợi cho em bé như thế nào?

- Các nghiên cứu đã cho thấy rằng chuẩn đoán sớm và nhanh chóng áp dụng liệu pháp kháng retro-virus (ART) có thể giảm đáng kể khả năng truyền virus HIV từ mẹ sang con đến mức 50%, thậm chí liệu pháp chỉ được bắt đầu thực hiện ngay khi sinh và tiếp tục với em bé mới sinh.