

جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور ایڈز سے بچاؤ



Urdu 巴基斯坦文

جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن (STIs) بنیادی طور پر براہ راست جنسی تعلق سے پھیلتے ہیں۔ یہ عام طور پر بیکٹیریا، وائرس یا کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ میں، مشہور ترین STIs میں سائی فیلس، گونور ہویا، غیر گونوکوکال یوریتھرا / غیر مخصوص تناسلی انفیکشن، تناسلی مہاسہ، تناسلی خارش، اور زیر ناف بالوں میں جونیوں شامل ہیں۔

ایڈز (حاصل کردہ مدافعتی کمزوری کی علامات)، جو کہ STIs میں سے ایک ہے، اس کا باعث (HIV) انسانی مدافعتی کمزوری کا وائرس) وائرس ہے۔ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد، HIV مسلسل مریض کے مدافعتی نظام کو تباہ کرے گا، مختلف قسم کی بیماریوں جیسا کہ کینسر اور متوقع انفیکشنز کا باعث بنے گا، اور بالآخر موت کی طرف لے جائے گا۔

مختلف STIs مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ عضو تناسل، پھٹی ہوئی جلد پر خارش، کم پرورش، آبلے، دردناک یا مسلسل پیشاب آنا، اور غیر عمومی مواد کا عضو تناسل یا فرج سے اخراج یہ تمام عمومی علامات ہیں۔ تاہم، کچھ STIs کی صورت میں، کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، جس سے لوگوں کو اپنے انفیکشن کے بارے میں جاننے میں مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر، HIV سے متاثرہ افراد میں شروع کے کچھ سالوں میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، تاہم وائرس کی منتقلی دوسرے لوگوں تک جاری رہتی ہے۔

STIs اور ایڈز کی منتقلی کے راستے

- 1. جنسی تعلق**
کسی متاثرہ شخص سے جنسی تعلق، بشمول فرج، اورال اور دبر میں جماع شامل ہیں۔
- 2. ماں سے بچہ کو**
متاثرہ ماؤں سے انکے شیر خوار بچوں کو پیدائش (ماں کا دودھ پینا) سے پہلے، دوران، اور بعد۔
- 3. خون سے رابطہ**
متاثرہ شخص کے ساتھ ٹیکوں کے آلات کا تبادلہ، یا آلودہ خون یا خون کی مصنوعات کی ترسیل۔

سماجی رابطہ جیسا کہ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، گالوں پر پیار کرنا، مل کر کھانا کھانا، اسکول جانا یا اکٹھے کام کرنا STIs اور ایڈز منتقل نہیں کرسکتا۔ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے STIs اور ایڈز کے منتقل ہونے کو کسی طبی ثبوت نے ظاہر نہیں کیا۔

STIs اور ایڈز کا علاج

STIs کسی شخص کے HIV انفیکشن کے خطرہ کو بڑھا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شدید صحت کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں، مثلاً بانچ پن، پیدائشی نقائص اور حتیٰ کے موت۔

ان دنوں، کچھ STIs کا علاج ادویات جیسا کہ اینٹی بائیو ٹکس سے کیا جاسکتا ہے۔ دوبارہ انفیکشن سے بچنے کے لیے، آپ کے شریکوں کو بھی چیک اپ اور علاج کروانا چاہیے۔ آپ کو دوران علاج جماع سے پرہیز کرنا چاہیے یا محفوظ طریقہ سے جماع کرنا چاہیے تاکہ وائرس کو پھیلانے سے بچا جاسکے۔ برائے مہربانی بہترین نتائج کے لیے علاج کا سارا کورس مکمل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ مکمل تندرستی یا انفیکشن کے اچھی طرح قابو میں آنے کو یقینی بنانے کے لیے، برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر یا کلینک کے مشورہ کے مطابق فالو اپ کو جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ کو کسی قسم کی علامات محسوس نہ ہوں۔

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو STI ہے، برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر سے جلد تشخیص اور علاج کے لیے مشورہ کریں۔ محکمہ صحت کے سماجی حفظان صحت کلینک STIs سے متعلق ٹیسٹ، علاج اور مشاورت فراہم کرتے ہیں۔ تمام معلومات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پہلے سے بکنگ یا ڈاکٹر کی طرف سے حوالہ کے خط کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے، برائے مہربانی محکمہ صحت کی ویب سائٹ: <http://www.dh.gov.hk> کا دورہ کریں۔ یا آپ کو ایک رجسٹرڈ میڈیکل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ برائے مہربانی خود ادویات نہ لیں کیونکہ اس سے مؤثر علاج میں دیر ہو سکتی ہے اور حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔

اگرچہ ایڈز کا علاج ابھی تک دستیاب نہیں ہے، اینٹی ریٹروائریل تھیراپی انسانی جسم میں HIV کو دبا کر اور مدافعتی نظام کو تباہ کرنے کے سلسلہ کو کم کر کے مؤثر طور پر انفیکشن پر قابو پاسکتی ہے۔ دیگر ادویات بھی دستیاب ہیں جو متوقع انفیکشنز اور دیگر پیچیدگیوں سے بچاؤ یا ان کے علاج میں مدد دیتیں ہیں۔ یہ HIV سے متاثرہ افراد کو اچھی معیاری لمبی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد دیتی ہے۔

جیسا کہ دیگر بیماریوں میں، جلد تشخیص اور جلد علاج حالت کو مزید خراب ہونے سے بچاسکتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کو ممکنہ طور پر HIV انفیکشن ہے، ڈاکٹروں سے مشورہ کریں اور جتنا جلد ہوسکے HIV ٹیسٹ کروائیں۔ آپ محکمہ صحت کی ایڈز ہاٹ لائن: (852) 2780 2211 کو مفت اور خفیہ HIV ٹیسٹ کے لیے کال کرسکتے ہیں۔ تمام معلومات خفیہ رکھی جاتی ہیں۔

جنسی طور پر متحرک افراد کو باقاعدگی سے چیک اپ اور HIV ٹیسٹ کروانا چاہیے

متعلقہ معلومات

- ایڈز ہاٹ لائن (کینٹونیز، انگلش اور پوتنگوا): (852) 2780 2211
- ایڈز ہاٹ لائن (تنگلوگ، ویتنامی اور تھائی): (852) 2359 9112
- ایڈز ہاٹ لائن (ہندی، انڈونیشین، نیپالی اور اردو): (852) 2112 9980
- محکمہ صحت کی ویب سائٹ: <http://www.dh.gov.hk>
- ہانگ کانگ کا ورچوئل ایڈز آفس: <http://www.aids.gov.hk>
- ایڈز ہاٹ لائن ویب سائٹ: <http://www.27802211.com>

STIs اور ایڈز سے بچاؤ کے لیے، محفوظ جماع کریں

STIs اور ایڈز سے بچنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہر جنسی عمل کے لیے کنڈوم کا درست استعمال ہے۔ منی کے تبادلے کے بغیر جماع جیسا کہ گال چومنا، مشت زنی، ایک دوسرے کو چھونے سے STIs اور HIV انفیکشن کا خطرہ کم ہے۔

مردانہ کنڈوم کا درست استعمال

1. ایک نیا، اچھے معیار وال کنڈوم استعمال کریں اور استعمال سے پہلے اختتامی مدت دیکھ لیں۔
2. عضو تناسل کے فرج، منہ یا دبر کو چھونے سے پہلے کنڈوم چڑھا لیں۔
3. احتیاط سے، کنڈوم کے سرے کو پکڑیں تاکہ ہوا باہر نکالی جاسکے۔ یہ منی کے اخراج کے لیے جگہ بنائے گا۔
4. کنڈوم کو تھے ہوئے عضو تناسل کے سرے پر چڑھائیں۔ اسے تھے ہوئے عضو تناسل پر زیر ناف بالوں تک چڑھا دیں۔
5. اگر ضرورت محسوس ہو تو مائع طرز کا چکنا کرنے والا مادہ استعمال کریں۔ تیل طرز کا چکنا کرنے والا مادہ کنڈوم کے پھٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔
6. منی کے اخراج کے بعد اور عضو تناسل کے ڈھیلا ہونے سے پہلے، کنڈوم کو سرے سے پکڑیں اور احتیاط سے اتاریں۔
7. نرمی سے کنڈوم کو عضو تناسل سے اتار دیں، یقینی بناتے ہوئے کہ منی باہر نہ گرے۔
8. استعمال شدہ کنڈوم کو ٹشو پیپر میں لپیٹیں اور کچرے میں پھینک دیں۔



ریڈ ربن سینٹر
 ٹیلی فون: (852) 3143 7200
 ویب سائٹ: <http://www.rrc.gov.hk>
 ریڈ ربن سینٹر کی طرف سے پیش کردہ۔ تکنیکی امداد کے لیے UNAIDS باہمی سینٹر، ہانگ کانگ