

## قبل از پیدائش ایج آئی وی (HIV) معائنه - مان بننے کے لیے پُر امید عورت کا خدشہ

### قبل از پیدائش معائنه کا مقصد



قبل از پیدائش معائنه کا مقصد دوران حمل حاملہ مان کی بہترین صحت کو یقینی بنانا ہے۔ اس معائنه کے ذریعے بیماری کا جلد سراغ لگایا جاتا ہے اور مان کے پیٹ موجود بچے کے صحت کو بہتر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قبل از پیدائش معائنه میں عام طور پر خون کا گروپ جانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ، پیمو گلوبن کی سطح، اوسط سرخ خلیہ حجم، ریبیسنس فیکٹر، روپیلا اینٹی بادی، ہسپاٹاکٹس بی اینٹیجن، سائیفیلیس اور ایج آئی وی (HIV) اینٹی بادی شامل ہوتے ہیں۔

### عالیگیر قبل از پیدائش ایج آئی وی (HIV) معائنه حاملہ خاتون کو کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے؟

ہبومن امیونو ڈیفی شینسی سٹریوم (AIDS) وائرس ایڈز کی بیماری کا سبب ہے، جسے مختصر طور پر ایج آئی وی (HIV) کہا جاتا ہے۔ منتقلی کے ذرائع میں جنسی میل جول، خون کا ملاب اور مان سے بچے کو ترسیل شامل ہے۔ انسانی جسم میں داخل ہوتے کے بعد یہ وائرس تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور اپنی تعداد بڑھاتے ہوئے رنگ مخلوق والی ایل آئی ایم پی ایج خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آپستہ آپستہ جسم کی قوت مدافعت کو کم کرتا ہے، مختلف متوقع انفیکشنوں یا حتیٰ کہ سرطان کا موجب بنتا ہے اور انعام کام موت کی نیند سلا دیتا ہے۔

مان سے بچے کو منتقلی کی بات کی جائے تو، ایج آئی وی (HIV) متاثرہ مان سے حمل، زچگی یا چھاتی سے دودھ پلانے کے عمل کے دوران اس کے بچے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ بغیر مداخلت کے، مان سے بچے کو منتقلی کی شرح 15 تا 40% ہے۔ موثر معالجہ اور دوران حمل، زچگی اور بعد از پیدائش بچے کو فراہم کردہ تحفظ کے ذریعے اس شرح کو 1-2% فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے۔

### علاج اور تحفظ

- متاثرہ حاملہ خاتون کو انٹائرٹروویرل تھریپی (ART) جس قدر جلد ممکن ہو شروع کر دینی چاہیے؛ انٹراوینس ART کی زچگی کے دوران بھی ضروری ہو سکتی ہے۔
- سیسیرین سیکشن بمقابلہ ویجینل زچگی کے حوالے سے خطرات و فوائد سے متعلق ان کے معالجین سے گفت و شنید کریں۔
- نوزائیدہ کو چھاتی سے دودھ پلانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔
- پیچیدگیوں سے بچاؤ اور جلد تشخیص کے لیے بچے کو اورل ART جاری رکھوانا چاہیے اور پیدائش کے بعد پیدیاٹریشن سے فالو اپ کروانا چاہیے۔
- ایک مرتبہ جب ثابت ہو جائے کہ انفیکشن ہے، تو بچے کو مناسب معالجہ دیا جائے گا، اور اس بچے/بچی کی صحت کی بہتری کے لیے فالو اپ نکھداشت فراہم کی جائے گی۔

### ایج آئی وی (HIV) معائنه کے نتیجے کی تعییر

ایک روایتی ایج آئی وی (HIV) معائنه میں ایک بہت سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ ٹیسٹ کا نتیجہ منفی (منفی) یا مثبت (+مثبت) ہو سکتا ہے۔ درج ذیل نتائج کی تعییرات ہیں۔

#### ایج آئی وی (HIV) اینٹی بادی (-منفی) نتیجہ

- ایک منفی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ حاملہ خاتون ایج آئی وی (HIV) معائنه کے وقت ایج آئی وی (HIV) سے متاثر نہیں ہے۔ تاہم، ایک فرد کو 'وندو پیریڈ' سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وندو پیریڈ وہ مدت ہے جو اس لمحہ کے دوران ہے جب ایک فرد ایج آئی وی (HIV) سے متاثر ہوتا ہے اور تب جب کہ ایج آئی وی (HIV) مثبت نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ ایج آئی وی (HIV) معائنه کاری کا وندو پیریڈ 3 مہینے ہے۔ ایک منفی نتیجہ بھی ہے انفیکشن کو خارج از امکان نہیں کر سکتا اگر صارف کا پیجھلے 3 مہینے میں کوئی حالیہ ایکسپووزر ہوا ہو۔ صارفین کو اس کا نوٹ لینا چاہیے اور معائنه کو دہرانا چاہیے یا شبہ کی صورت پیدا ہو تو معالج سے مشورہ لینا چاہیے۔

• ایک حاملہ خاتون جس کا ایج آئی وی (HIV) بلڈ نتیجہ منفی آیا ہو اسے خود کو اور نوزائیدہ بچے کو حمل اور چھاتی کا دودھ پلانے کے عمل کے دوران ایج آئی وی (HIV) کی ترسیل سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات لینے پر عمل جاری رکھا چاہیے۔ اس میں محفوظ جنسی عمل جیسا کہ کنڈوم کا استعمال، سوئی کے شراکت سے بچنے اور زائد خطرے کے رویوں سے گریز پر عمل پیرا ہونا شامل ہے۔

• کسی بھی ایسی حاملہ خاتون جس میں حمل کی مدت کے دروان ایج آئی وی (HIV) سٹیٹس اپنے کا شبہ ہو تو اسے ادوارہ ایج آئی وی (HIV) ٹیسٹ کے لیے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔

#### ایج آئی وی (HIV) اینٹی بادی مثبت (+مثبت) نتیجہ

• ایک مثبت نتیجہ کا مطلب ہے کہ حاملہ خاتون ایج آئی وی (HIV) سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ وہ فیٹس اور جنسی عمل کے ذریعے اپنے جنسی پارٹر کے اندر وائرس کو منتقل کر سکتی ہے۔

**ایج آئی وی (HIV) اینٹی بادی معائنه کا نتیجہ مکمل طور پر رازداری میں رکھا جاتا ہے۔**

## ابتدائی تشخیص - یہ حاملہ خاتون کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے؟

- جس قدر جلد انفیکشن کی تشخیص پو جائے، اسی قدر بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔
- معیاری قبل از وقت پیدائش کی نگہداشت سے قطع نظر، صحت کی نگہداشت کے فرایم کنندگان مل کر کام کرتے ہیں تاکہ متاثر فرد میں مجموعی نگہداشتی عمل کو بروائی چڑھا سکیں۔
- حاملہ خاتون کو ایچ آئی وی (HIV) بیماری پر قابو پانے کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو ART کی پیشکش کی جائے گی۔
- بذریعہ مشاورت، حاملہ خاتون اپنی جسمانی اور نفسیاتی صلاحیت سے آگاہ ہو پائے گی تاکہ بیماری کا مقابلہ کرے، اور حمل کے جاری رکھنے کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔
- حاملہ خاتون اپنے ایچ آئی وی (HIV) استیٹس سے متعلق اپنے جنسی پارٹنر یا خاندان کو آگاہ کرنے سے متعلق انتخاب کر سکتی ہے۔ صحت کی نگہداشت کے فرایم کنندہ اسے اور اس کے خاندان کو امداد اور مشاورت کی پیشکش کریں گے۔
- متاثرہ ماد ادویات کے ذریعہ علاج جاری رکھے گی اور زچگی کے بعد بیماری کا فالو اپ کرے گی تاکہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے اور پیچیدگیوں سے بچ سکے۔ وہ سیکھے گی کہ اپنے بچے کی نگہداشت کیسے کرنی ہے اور خون سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی منتقلی سے کیسے آگاہ رہنا ہے۔

## فوری ایچ آئی وی (HIV) معائنه کا مقصد

یہ ایم ہے کہ ایک حاملہ خاتون زچگی سے قبل اپنے ایچ آئی وی (HIV) استیٹس سے آگاہ ہو۔ پانگ کانگ میں، تمام حاملہ خواتین کا قبل از وقت پیدائش معائنه کاری کے عمل کے دوران روؤں میں یہ معائنه کیا جاتا ہے۔ اس لیے، کوئی بھی ایسی خاتون جو کہ زچگی کے مرحلہ کے قریب ہو اور جس نے ابھی تک ایچ آئی وی (HIV) استیٹس نہ معلوم ہو، اسے فوری طور پر ریڈ ایچ آئی وی (HIV) ٹیسٹ کروانا چاہیے جس میں صرف چند منٹس لگتے ہیں تاکہ بچ کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ ٹیسٹ کا نتیجہ 20 منٹوں کے بعد ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

## ریڈ ٹیسٹ کیا ہے اور یہ کس طرح لیا جاتا ہے؟

- یہ ٹیسٹ خون کے نمونے میں ایچ آئی وی (HIV) اینٹی بادیز کو شناخت کرتا ہے۔
- خون کا نمونہ انگلی کی شگاف زنی یا وینپنکچر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کی انگلی سے خون کا ایک قطرہ لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کا نتیجہ 20 منٹوں کے بعد ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
- ریڈ ایچ آئی وی (HIV) ٹیسٹ منفی (-منفی) اور مثبت (+منبیت) بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مثبت ریڈ ٹیسٹ کے نتیجے کے بعد ایک تصدیقی ٹیسٹ بھی ازان بعد لیا جانا چاہیے جو کہ وینس بلڈ کا ہوتا ہے اور لیبارٹری میں لیا جاتا ہے۔



(1) خون نکالنے کے لیے انگلی میں شگاف زنی



(2) لوپ (مع خون) کو ٹیسٹ کت میں ڈالیں



(3) ٹیسٹ کا نتیجہ

خود اپنی اور بچے دونوں کے تحفظ کے لیے، براہ مہربانی قبل از پیدائش ایچ آئی وی (HIV) معائنه کاری پر غور کیجیے۔ جلد تشخیص آپ اور آپ کے بچے دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

اگر ایچ آئی وی (HIV) ٹیسٹ اور AIDS کے حوالے سے آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہوں، تو براہ مہربانی اپنے معالج یا نرس سے بات کریں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ AIDS ہات لائن کے ذریعہ 2780 2211 پر ہمارے کونسلر سے رابطہ کریں۔



ریڈ رین سنٹر - یو این ایڈز مرکز امداد بابی برائے تکنیکی امداد  
پته: 2/F., Wang Tau Hom Jockey Club Clinic, 200 Junction Road East, Kowloon, Hong Kong.

ٹیلی فون: (852) 7200 3143 فیکس: (852) 0534 2338

ویب سائٹ: [www.rrc.gov.hk](http://www.rrc.gov.hk)

PA/AA4/19-10(O)/WOM-INF